

SARS –CoV-2 INFORMATIONSBLATT

Liebe Klientin, lieber Klient!

Voraussetzung für die Durchführung Ihrer sportärztlichen Untersuchung am ISAG ist:


- **Getestet - Negativer PCR-Test nicht älter als 72 Stunden**
- **Genesen** - Ärztliche Bestätigung bzw. Absonderungsbescheid über eine überstandene Infektion (Gültigkeit bis zu 6 Monate nach kurerter Infektion)
- **Geimpft** - Nachweis über eine erfolgte Impfung:
 - Erstimpfung: Gültig ab dem 22. Tag nach Impfung bis maximal 3 Monate nach Impfung
 - Erst- und Zweitimpfung: Gültig ab dem 22. Tag nach Erstimpfung bis maximal 9 Monate nach der Zweitimpfung
 - Impfung nach einer nachgewiesenen Infektion: Gültig bis zu 9 Monate nach Impftermin
 - Impfstoffe, bei denen nur eine Dosis vorgesehen ist: Gültig ab dem 22. Tag bis maximal 9 Monate nach Impftermin bzw. für Janssen-Geimpfte gilt ab 3.1.2022: Es braucht eine 2. Dosis für einen gültigen Grünen Pass.

Um einen optimalen Ablauf und auch Vorsichtsmaßnahmen am ISAG einzuhalten, gelten die derzeit vom Sozialministerium für Gesundheit empfohlenen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln. Neben den allgemein gültigen Regeln besteht auch eine Einschränkung der Personenzahl am ISAG. Deshalb denken Sie bitte daran, Ihren Termin am ISAG **ohne Begleitung** wahrzunehmen (Begleitpersonen sind auch Eltern, Großeltern, Trainer, etc.) und die vereinbarte Uhrzeit für Ihren Termin exakt einzuhalten. Sollten Sie sich nicht komplett gesund fühlen, wird um eine umgehende Terminverschiebung gebeten (0512-504-23450).

Wir bitten Sie, eine **FFP-2-Schutzmaske** (**KEIN** herkömmlicher **MNS**) beim vereinbarten Termin zu tragen. Vor Betreten des Krankenhauses ist das Ausfüllen eines Covid-19-Fragebogens hinsichtlich Ihres Gesundheitszustandes notwendig.



Wo es vorgeschrieben ist, trage ich eine FFP2-Maske. So schütze ich mich selbst und andere am besten. Ansonsten verwende ich einen eng anliegenden Mund-Nasen-Schutz.



Ich halte mindestens 2 Meter Abstand zu anderen. Es darf auch gerne etwas mehr sein. So kann die Virus-Ausbreitung eingedämmt werden.



Ich wasche regelmäßig meine Hände mit Seife oder verwende Desinfektionsmittel, um sie gründlich zu reinigen.



Ich niese oder huste in meine Armbeuge oder in ein Taschentuch, das ich gleich entsorge. So können sich Keime und Viren nicht so schnell verbreiten.